



NOVEMBRINHO AZUL

“Porque a saúde do homem se constrói com os cuidados na infância”

Uma das principais patologias a serem precocemente identificadas e tratadas na criança visando a preservação da fertilidade futura e diminuição do risco de câncer testicular é a **criptorquidia** ou testículo não descido.

Entre os anos de **2019 e 2024** um total de **46.534** cirurgias de orquidopexia foram realizadas, entretanto, muitas delas feitas após a idade sugerida pelas sociedades médicas.

A **torção testicular** é uma urgência médica, o atraso no tratamento cirúrgico leva ao risco aumentado de perda testicular e consequente risco de fertilidade futura!

Entre os anos de **2019 e 2024** foram realizadas **8.046** cirurgias em âmbito nacional. Infelizmente muitas delas tardiamente e com perda funcional do testículo ou mesmo orquiectomia.

Vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano)

Desde 2014 a vacinação contra o HPV está disponível no SUS e abrange a população de 9 a 14 anos, em dose única.

Infelizmente a cobertura vacinal chega apenas a valores **inferiores a 50%** nos meninos de 9 a 14 anos!



**Isso não são apenas números.
São alertas de saúde pública!**

VIRE

O que é o Novembrinho Azul

É uma campanha nacional estabelecida pela Lei 14.694, de 10 de outubro de 2023. Inspirada no Novembro Azul, que se dedica à saúde masculina, essa iniciativa tem como objetivo promover a saúde de crianças e adolescentes até 15 anos. A campanha prioriza a identificação precoce e o tratamento preventivo de diversas condições de saúde da criança que podem trazer prejuízos no futuro.

Neste ano, vamos focar em temas cruciais, como testículo não descido, torção testicular, vacinação contra o HPV e cuidados com a fimose. Também abordaremos infecções urinárias, desfralde e enurese, visando uma saúde integral para os meninos.

Testículo não descido (criptorquidia)

É uma das malformações congênitas mais comuns em meninos, afetando cerca de 4% dos nascidos a termo e até 40% dos prematuros.

O diagnóstico é feito apenas por exame físico, sem necessidade de exames de imagem, exceto em casos específicos.

O tratamento cirúrgico deve ser realizado a partir do 6º mês de vida (ajustado para a idade gestacional), preferencialmente dentro do primeiro ano e não posterior aos 18 meses.

Intervir precocemente é fundamental para garantir a saúde e o desenvolvimento adequado testicular.

Torção testicular (escroto agudo)

É uma **emergência médica** que requer tratamento cirúrgico imediato. O tempo é crucial: cada segundo conta para aumentar as chances de preservar a função testicular.

Os sintomas incluem dor intensa, endurecimento testicular, inchaço, náuseas, vômitos e ausência do reflexo cremastérico. Um questionário chamado TWIST score pode ajudar a guiar a decisão sobre a cirurgia.

Embora o ultrassom com doppler seja uma ferramenta diagnóstica importante, a cirurgia não deve ser adiada para a realização de exames de imagem quando há forte suspeita clínica.

Realização:



SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA

Veja mais em:



portaldaurologia.org.br