

SÃO SINAIS DE ALERTA PARA A TORÇÃO DE TESTÍCULO E NECESSITAM DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA

Dor intensa ;

Endurecimento testicular;

Náuseas e vômitos

Inchaço na região;

A cirurgia não deve ser adiada para a realização de exames de imagem como o ultrassom com doppler.

Na forte suspeita clínica deve-se realizar a cirurgia imediatamente.

Ficou com dúvidas? Procure por um especialista!!



Saiba mais em:



portaldaurologia.org.br

Realização:



As informações contidas neste folheto não têm a intenção de substituir a consulta médica ou promover aconselhamento médico. A Sociedade Brasileira de Urologia se isenta de toda responsabilidade legal, independente da causa, incluindo negligência pelo uso indevido ou uso para autodiagnóstico baseado nas informações expressas no texto. Na dúvida procure um médico/a. Todos os direitos reservados 2024.



NOVEMBRINHO AZUL



“Porque a saúde do homem se constrói com os cuidados na infância”

TORÇÃO TESTICULAR

Como suspeitar e como agir?

A torção testicular ou escroto agudo é uma emergência médica que requer tratamento cirúrgico imediato.

O tempo é muito importante para preservação da função testicular.

QUANDO OCORRE A TORÇÃO TESTICULAR

A torção do testículo pode ocorrer em qualquer idade no homem... Entretanto ocorre mais frequentemente no período pré-natal (durante a gravidez e é uma causa de criptorquidia), neonatal e próximo à puberdade, nessa última, o pico de incidência da torção será dos 12 aos 25 anos.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS INICIAIS?

Exceto no período neonatal a *dor* testicular estará presente.

Para as *crianças menores e antes da puberdade* os sintomas podem ser inespecíficos como dor abdominal, dor suprapúbica, náuseas e vômitos!

Examine a região testicular do seu filho se ele apresentar as queixas acima!



ALÉM DA DOR, O QUE MAIS PODE LEVAR À SUSPEITA?

Podem estar presentes outros sinais como :

- alteração da cor (vermelhidão do escroto)
- endurecimento
- posição horizontal do testículo
- ausência do reflexo cremastérico

POSSO MEDICAR E ESPERAR PARA VER SE A DOR MELHORA?

A torção testicular é uma condição urgente que requer tratamento cirúrgico imediato. O maior determinante de sucesso de salvamento do testículo é o tempo entre o início dos sintomas e a abordagem cirúrgica.

NA DÚVIDA, HÁ ALGUM EXAME A SER FEITO?

Pode-se realizar um ultrassom doppler para avaliação do fluxo vascular. Entretanto, na forte suspeita ou dúvida diagnóstica a cirurgia deve ser realizada.

Como melhorar o diagnóstico de torção

Há tabelas que auxiliam no diagnóstico, dando pontuação aos sintomas clínicos.

Quanto mais pontos, maior a chance de ser uma torção. A mais conhecida delas é o *TWIST The Testicular Workup for Ischemia and Suspected Torsion*

Inchaço testicular	2 pontos
Testículo duro	2 pontos
Testículo alto	1 ponto
Reflexo cremastérico ausente	1 ponto
Náusea ou vômito	1 ponto

A cirurgia tem indicação para preservação testicular e proteção da fertilidade futura.

