



**CONTINUA SENDO O
MELHOR REMÉDIO!**

DEZEMBRO VERMELHO
CAMPANHA DE PREVENÇÃO SOBRE AS ISTs E AIDS



ÚLCERAS GENITAIS

Úlceras genitais são lesões que surgem na pele ou mucosa da região genital, podendo ocorrer em homens e mulheres. São frequentemente causadas por infecções sexualmente transmissíveis (IST), e podem apresentar os seguintes sintomas:

- Dor e desconforto local
- Pústulas e/ou vesículas (pequenas bolhas com líquido)
- Ardor, coceira
- Drenagem de secreção purulenta
- Sangramento
- Gânglios inflamados nas virilhas (ínguas)



As principais IST que podem causar úlceras genitais são:

- Sífilis ou cancro duro
- Herpes genital
- Cancroide ou cancro mole
- LGV ou lífogranuloma venéreo
- Donovanose

O tratamento das úlceras genitais deve ser imediato para evitar complicações e reduzir a transmissão.

A forma de tratamento depende do tipo de IST, mas pode incluir analgésicos, tratamentos tópicos com cremes, pomadas e soluções líquidas e, na maioria dos casos, antibióticos.

Fatores de risco para as IST incluem:

- Ter novos ou múltiplos parceiros
- Ter histórico prévio de outras ISTs
Não usar preservativos ou usá-los de forma irregular ou inadequada.



Prevenção

Realização:



SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA

Parceria: